BOTULİNUM TOKSİN / 28

Botulinum Toksin

Mimik çizgileri için uygulama

Etki hemen tamamlanmaz; sonuç ve ek uygulama gereksinimi planlanan kontrol muayenesinde değerlendirilir.

01 İşlemden önce

- İlaçlarınızı, takviyelerinizi ve alerjilerinizi bildiriniz. Kan sulandırıcılar dahil reçeteli ilaçlarınızı hekiminize danışmadan bırakmayınız.
- Kas-sinir hastalığı, gebelik/emzirme, antibiyotik veya kas gevşetici kullanımı ve önceki toksin reaksiyonlarını bildiriniz.
- Önceki toksin uygulamalarının tarihini ve varsa göz kapağı düşüklüğünü bildiriniz.

02 İşlemden sonra

- Enjeksiyon alanını ovalamayınız ve masaj yapmayınız. İlk 2 saat yoğun fiziksel aktiviteyi erteleyiniz.
- Göz kapağı düşüklüğü, göz kuruluğu veya belirgin asimetri gelişirse kontrol için bize ulaşınız.
- İğne girişlerini temiz tutunuz. Ek doz veya farklı bir merkeze yeni uygulama için kontrol değerlendirmesini bekleyiniz.

Bize ne zaman ulaşmalısınız?

Yutma, konuşma veya nefes almada güçlük, yaygın kas güçsüzlüğü ya da çift görmede acil değerlendirme alınız; nefes/yutma güçlüğünde 112’yi arayınız. Bize de bilgi veriniz.

Nefes darlığı, dil/boğaz şişmesi, ani görme değişikliği veya bilinç kaybında 112’yi arayınız; WhatsApp yanıtı beklemeyiniz. Acil başvurunuzun ardından bize de bilgi veriniz.

SİZE ÖZEL PLAN / Hekiminiz tarafından doldurulur

Bakım / ürün: ..... Kontrol: .....

Yıkama / makyaj / aktivite / diğer: .....

YANINIZDAYIZ

0533 430 04 44

Telefon veya WhatsApp ile ulaşınız.

WhatsApp üzerinden yazın →